

过敏性休克的症状和体征

过敏性休克 (an-a-fi-LAK-sis) 是一种严重的过敏反应, 发病迅速, 有可能危及生命。最常见的过敏反应是对食物、毒液、药物和乳胶的反应。

接触过敏原后可能单独 (*) 或以任何组合形式出现的过敏性休克症状和体征包括

嘴巴:

嘴唇/舌头/腭(口腔顶部) 瘙痒、刺痛、肿胀

* 喉咙:

声音嘶哑、喉咙、困难 吞咽、咳嗽、喘鸣 (吸气时发出高亢的声音)

* 肺:

喘息、咳嗽、胸痛、胸闷

肠胃:

腹痛、恶心、呕吐、腹泻

中枢神经系统/大脑:

焦虑、恐慌、末日感

眼睛/鼻子:

鼻塞、打喷嚏、眼睛发红、眼睛发痒、肿胀

皮肤:

荨麻疹或其他皮、发红/潮红、瘙痒、肿胀

* 循环/心脏:

胸痛、低血压、脉搏微弱、休克、面色苍白、头晕或昏厥、嗜睡 (缺乏活力)

* 直接和潜在的危及生命的症状

请咨询经委员会认证的过敏专科医生, 以获得准确的诊断和治疗方案。

虽然大多数过敏性休克患者会出现皮肤症状, 但一些最严重的病例不会出现皮疹、荨麻疹、肿胀等症状。

EPINEPHRINE 是治疗过敏性休克的一线药物

抗组胺药、吸入器和其他治疗方法只能作为辅助治疗使用

始终随身携带两 (2) 个肾上腺素装置

当您或您认识的人开始出现症状时, 请立即拨打 9-1-1!



FoodAllergyAwareness.org

食物过敏认知之声